

Rótulo-bula

1. Bovecto Pour On

1.1 Geraniol

Clorpirifós

Butóxido de piperonila

Geraniol

1.2 Antiparasitário externo

USO VETERINÁRIO

2. APRESENTAÇÕES

Frasco plástico dosador contendo 1 L;
Frasco plástico dosador contendo 500 mL; e
Frasco plástico dosador contendo 2 L.

3. FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina 5,0 g;

Clorpirifós 7,0 g;

Butóxido de piperonila 5,0 g;

Geraniol 2,0 g;

Excipiente q.s.p 100 mL.

4. INDICAÇÕES

O produto **BOVECTO® POUR ON** é um antiparasitário externo indicado para o controle e tratamento das infestações causadas pelos principais ectoparasitas de bovinos, sendo eles: **carrapato** (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*); **berne** (larvas de *Dermatobia hominis*); **mosca-dos-chifres** (*Haematobia irritans*).

5. POSOLOGIA

Uso tópico. Aplicar no dorso do animal ao longo do fio do lombo na dosagem de 10 mL para cada 100 kg de peso vivo.

Peso do animal	Dosagem
Até 100 kg	10 mL
De 101 a 200 kg	20 mL
De 201 a 300 kg	30 mL
De 301 a 400 kg	40 mL
De 401 a 500 kg	50 mL

Para acima de 500 kg de peso vivo a dose máxima recomendada é de 50 mL.
Intervalo entre doses: o intervalo entre as aplicações varia com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho, de acordo com a indicação do médico-veterinário.

6. ADVERTÊNCIAS

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico levando a embalagem ou o rótulo do produto;

Atender o período de carência informado na rotulagem;

Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

Perigo! Causa danos se ingerido;

Não aplicar próximo a chamas.

7. ANTÍDOTO

Cipermetrina: grupo químico piretróide. Sem antídoto específico, o tratamento deve ser sintomático.

Clorpirifós: grupo químico organofosforado. Antídoto: sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (contraction ou PAM).

Butóxido de piperonila: sinergista da cipermetrina. Não existe antídoto específico, o tratamento deve ser sintomático.

Em caso de contato do produto com a pele e mucosas lavar com água e sabão. Em casos de intoxicação humana, procurar um médico levando consigo a embalagem do produto.

8. CONTRAINDICAÇÃO

Não deve ser administrado em fêmeas em estado avançado de gestação, animais debilitados, doentes ou com problemas hepáticos. Respeitar o jejum de ração e concentrados, manter os animais somente com alimentos volumosos (verdes) nas 12 horas anteriores e 12 horas posteriores ao tratamento. Este produto é contraindicado para bubalinos.

9. PRECAUÇÃO

Deve-se obedecer às dosagens e recomendações de uso do produto. Não aplicar em dias muito quentes e em horários com sol intenso. Produto tóxico para peixes. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto. Lavar as mãos após o manuseio do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Não utilize nem guarde perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene doméstica e do fogo. Manter a embalagem fechada. Não lavar as embalagens vazias para evitar a contaminação de rios e açudes.

10. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

A utilização do produto simultaneamente a outros medicamentos à base de organofosforados e carbamatos deve ser avaliada e observada atentamente pelo médico-veterinário, para prevenir a ocorrência de intoxicações.

11. PERÍODO DE CARÊNCIAS

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 16 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 9 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DO PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NO VERSO DO PRODUTO PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 006033-0.000010 em 20/02/1995.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico-veterinário.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Isabela Fernandes de Oliveira
CRF 115201/SP

PROPRIETÁRIO

PEARSON SAÚDE ANIMAL S.A. Rod. Pres. Castello
Branco, Km 35,6 – Itapevi – SP – CNPJ: 07.746.586/0002-68.

FABRICANTE

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários LTDA. Rod.
Raposos Tavares, Km 113 - Araçoiaba da Serra – SP - CEP 18190-000 -
CNPJ 64.687.015/0001-52.

® Marca registrada — Indústria brasileira

Partida (PART.)	[Pode ser carimbo]
Fabricação (FABR.)	
Vencimento (VENC.)	

Conteúdo: 1 L