

**1. Nome do produto** Doramec

**1.1 Molécula** Doramectina

**1.2 Classe terapêutica:** Antiparasitário para bovinos, suínos e ovinos

**USO VETERINÁRIO**

**2. APRESENTAÇÕES**

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 50 mL;  
Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 200 mL;  
Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 500 mL;  
Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 1000 mL.

**3. FÓRMULA**

Cada 100 mL contém:  
Doramectina ..... 1,0 g;  
Excipiente ..... q.s.p 100 mL.

**4. PROPRIEDADES**

A doramectina pertence à classe dos endectocidas do grupo das lactonas macrocíclicas. O principal mecanismo de ação é se ligar a receptores dos canais de íons cloreto no sistema nervoso dos nematódeos e artrópodes, aumentam a permeabilidade da membrana aos íons cloreto. Isto inibe a atividade elétrica das células nervosas em nematoides e células musculares em artrópodes e provoca paralisia e morte dos parasitas.

**5. INDICAÇÕES**

**Bovinos:**

O produto Doramec é indicado para o tratamento de:

Helmintos gastrintestinais (formas adultas): *Haemonchus placei*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* e *Trichostrongylus axei*.

Bernes: larvas de *Dermatobia hominis*.

Carrapatos: *Rhipicephalus boophilus microplus*.

Mosca do chifre: *Haematobia irritans*.

Miíase (bicheiras): larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

**Ovinos:**

O produto Doramec é indicado para o tratamento de:

Helmintos gastrintestinais (formas adultas): *Haemonchus contortus*,  
*Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia curticei*, *Strongyloides papillosu*.

**Suínos:**

O produto Doramec é indicado para o tratamento de:

Sarna: *Sarcoptes scabiei*.

**6. POSOLOGIA**

Administrar a dose de 1,0 mL para 50 kg de peso vivo (200 µg/kg de peso vivo de doramectina) para bovinos e ovinos, por via subcutânea, dando preferência à região próxima à escápula, onde a pele é mais solta.

Em suínos administrar a dose de 1,0 mL para 33 kg de peso vivo (300 µg/kg de peso vivo de doramectina), por via intramuscular.

Doramec é produto de dose única. Deve ser usado de acordo com o controle estratégico de parasitas que se aplica para cada fazenda.

**7. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Utilize agulhas e seringas estéreis;  
Desinfetar o local da aplicação;  
Usar luvas de borracha na aplicação;  
Evitar o contato com a pele;  
Lavar as mãos após o manuseio do produto;  
Embalagens vazias e restos do produto, devem ser descartados adequadamente.

**8. EFEITOS ADVERSOS**

Após a aplicação do produto pode ocorrer pequeno desconforto ou um edema transitório no local da aplicação, que desaparecem sem nenhum tratamento.

**9. ANTÍDOTO**

Não há antídoto específico para intoxicação, mas alguns estudos têm demonstrado que a picrotoxina, um antagonista do GABA, reverte o bloqueio do estímulo nervoso induzido pela doramectina.

**10. CONTRAINDICAÇÃO**

Não deve ser administrado em vacas que produzam leite para o consumo humano durante a lactação.

**11. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA**

Não utilizar com cetoconazol, itraconazol, ciclosporina e os bloqueadores de canais de cálcio.

## **12. PERÍODO DE CARÊNCIAS**

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

### **BOVINOS**

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 73 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

### **OVINOS**

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 27 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

### **SUÍNOS**

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 39 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

**Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

**Utilizar todo conteúdo do frasco em no máximo 90 dias (03 meses após a abertura).**

**Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 000009-4.000003 em 02/06/2003.**

**Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico-veterinário.**

### **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Roberta Costa e Sousa Rezende

CRF-SP 88.540

**PROPRIETÁRIO E FABRICANTE**

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A

Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;

Itapevi – SP;

CEP: 06696-000;

CNPJ: 61.190.096/0008-69.

**DISTRIBUÍDO POR**

PEARSON SAÚDE ANIMAL;

Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;

Itapevi – SP;

CEP: 06696-000;

CNPJ: 07.746.586/0002-68.

Conteúdo: 50 mL / 200 mL / 500 mL / 1000 mL