

Bula

1. Nome do produto Ectonil Pulverização

1.1 Molécula Cipermetrina

1.2 Classe terapêutica carrapaticida e mosquicida para bovinos

USO VETERINÁRIO

2. APRESENTAÇÕES

Frasco de plástico tipo pulverizador contendo 20 mL;
Frasco de plástico tipo pulverizador contendo 250 mL;
Frasco de plástico tipo pulverizador contendo 1 L.

3. FÓRMULA

Cada 100 mL contém:
Cipermetrina 15 g;
Excipiente q.s.p 100 mL.

4. INDICAÇÕES

O produto Ectonil é indicado para o controle e tratamento de carrapatos (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*) e mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos.

5. POSOLOGIA

Uso tópico. Ectonil Pulverização deve ser pulverizado por todo o corpo do animal principalmente, orelhas, base dos chifres, barbelas, axilas, entre os membros, virilha e inserção da cauda. Recomenda-se utilizar 5 mL do produto diluídos em 5 litros de água para cada animal adulto.

Diluição:

Ectonil Pulverização deve ser diluído na proporção de 1 (uma) parte do produto para 1.000 partes de água, ou seja, diluir 1 litro do produto para 1000 litros de água.

A tabela abaixo mostra o esquema de diluição do produto:

Ectonil Pulverização	Água
20 mL	20 litros
250 mL	250 litros
1 L	1000 litros

6. ADVERTÊNCIAS

A higiene é fundamental, lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário;

Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto;

Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica;

Não reutilizar as embalagens;

Obedecer às dosagens e recomendações para o uso do produto.

7. EFEITOS ADVERSOS

Alguns animais podem apresentar sensibilidade ao produto como: meneios de cabeça e cauda, agitação e diminuição do apetite, porém esses sintomas tendem a desaparecer após 24 horas da aplicação do produto. Em casos mais severos de sensibilidade, o animal pode apresentar reações cutâneas, devido ao uso incorreto do produto, como por exemplo, a não distribuição homogênea do produto no animal ou sobredose.

8. CONTRAINDICAÇÃO

- Não utilizar o produto em animais sensíveis aos princípios ativos;
- Não utilizar o produto nos animais em horário de sol intenso;
- Não utilizar o produto em dias de chuva;
- Não utilizar o produto concomitante a outro ectoparasiticida externo.

9. PERÍODO DE CARÊNCIAS

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 07 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 24 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO;

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 006033-0.000004 em 20/02/1995.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico-veterinário.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Isabela Fernandes de Oliveira;
Farmacêutica - CRF 115201/SP.

PROPRIETÁRIO E DISTRIBUIDOR

PEARSON SAÚDE ANIMAL S.A;
Rod. Pres. Castello Branco, Km35,6, Itaqui;
Itapevi –SP;
CEP: 06.696-000;
CNPJ:07.746.586/0002-68.

FABRICANTE

IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA;
Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Bairro Barreiro /Araçoiaba da Serra - SP,
CEP: 18190- 000;
CNPJ: 64.867.015/0001-52

® Marca registrada — Indústria brasileira