

Bula

1. Nome do produto Helmiben

- 1.1 Molécula** Febantel
Pamoato de pirantel
Praziquantel

1.2 Classe terapêutica Antiparasitário

USO VETERINÁRIO

2. APRESENTAÇÕES

Cartucho contendo 1 blister com 2 comprimidos;
Cartucho contendo 2 blísteres com 2 comprimidos;
Cartucho contendo 3 blísteres com 2 comprimidos.

3. FÓRMULA

Cada 600 mg contém:

Febantel 150 mg;

Pamoato de pirantel 144 mg;

Praziquantel 50 mg.

4. PROPRIEDADES

Helmiben® é uma associação de três antiparasitários internos que possuem mecanismos e espectros de ação diferentes entre si. O febantel atua sobre estágios imaturos e adultos de nematódeos, através de sua ligação à tubulina, a subunidade estrutural proteica dos microtúbulos, estruturas que compõem o citoesqueleto da célula, interrompendo processos vitais para função celular, como a divisão mitótica, o transporte de nutrientes e a alteração na forma da célula. O pirantel também possui ação em estágios adultos e imaturos de nematódeos gastrointestinais. É um agente bloqueador neuromuscular despolarizante, estimulando a junção mioneural do parasita, agindo como agonistas dos receptores nicotínicos da acetilcolina, produzindo uma paralisia espástica do parasita. O praziquantel age sobre cestódeos. Ele possui efeito sobre o potencial de membrana das células musculares no parasito que resulta na contração muscular parálitica (paralisia espástica) e desintegração do tegumento do parasita. A combinação sinérgica de febantel, pirantel e praziquantel também é efetiva em reduzir a excreção de cistos de *Giardia* spp.

5. INDICAÇÕES

O produto Helmiben é indicado no tratamento de cães parasitados pelos nematódeos gastrintestinais *Ancylostoma* spp., *Trichuris vulpis* e *Toxocara* spp., pelo cestódeo *Dipylidium caninum* e pelo protozoário *Giardia* spp.

6. POSOLOGIA

Administrar a dose de 15 mg de febantel + 14,4 mg de pamoato de pirantel + 5 mg de praziquantel por kg de peso, que corresponde a um comprimido para 10 kg de peso, conforme tabela abaixo para:

Peso (kg)	Quantidade
Até 2,5 kg	¼ comprimido
Entre 2,6 kg e 5 kg	½ comprimido
Entre 5,1 kg e 7,5 kg	½ + ¼ comprimido
Entre 7,6 kg e 10 kg	1 comprimido
Acima de 10 kg	Proporcional conforme as dosagens descritas acima

Administrar a dose recomendada em função do peso do cão por via oral, diretamente em sua boca ou misturado com alimento.

Para o tratamento de verminoses gastrintestinais administrar uma única dose.

Para o tratamento da giardíase, administrar uma dose a cada 24 horas, durante três dias consecutivos.

Devido ao ciclo de vida dos parasitas, pode ser necessário repeti-lo após sete dias.

INTOXICAÇÃO E SUPERDOSAGEM NOS ANIMAIS

Devido à ampla margem de segurança dos princípios ativos do produto, intoxicações não esperadas;

Caso ocorram, consultar um médico veterinário.

7. ADVERTÊNCIAS

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos;

Ler a bula atentamente antes de administrar o produto.

8. EFEITOS ADVERSOS

Em doses usuais, geralmente não causa efeitos adversos;

Podem ser observados anorexia, vômito ou diarreia nos cães;

Podem ocorrer reações de hipersensibilidade secundárias à liberação de antígenos por parasitas mortos, particularmente em altas dosagens.

9. ANTÍDOTO

Não há antídotos específicos. O tratamento deve ser sintomático e de suporte.

10. CONTRAINDICAÇÃO

Não utilizar em gatos;

Não utilizar em cães com menos de duas semanas de idade;

Não utilizar em cães muito debilitados;

Não utilizar em conjunto com levamisol, morantel ou organofosforados, pois há risco de intoxicação;

Não utilizar junto com piperazina pois haverá efeito antagonista;

A segurança do produto não foi avaliada em fêmeas prenhas.

11. PRECAUÇÃO

Para evitar a reinfecção dos animais, as fezes devem ser recolhidas e o ambiente deve ser limpo com desinfetantes;

Lavar as mãos após o manuseio do produto.

Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 000009-4.000010 em 26/01/2023.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico-veterinário.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Roberta Costa e Sousa Rezende

CRF-SP 88.540

PROPRIETÁRIO

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A

Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaquí;

Itapevi – SP;

CEP: 06696-000;

CNPJ: 61.190.096/0008-69.

FABRICANTE

IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA;
Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Bairro Barreiro /Araçoiaba da Serra - SP,
CEP: 18190- 000;
CNPJ: 64.867.015/0001-52

DISTRIBUÍDO POR

PEARSON SAÚDE ANIMAL;
Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;
Itapevi – SP;
CEP: 06696-000;
CNPJ: 07.746.586/0002-68.

® Marca registrada — Indústria brasileira