

Cartucho-bula

1. Nome do produto Hipotac

1.1 Molécula Albendazol Triclorfon

1.2 Classe terapêutica Vermicida para equinos

USO VETERINÁRIO

2. APRESENTAÇÕES

Seringa plástica contendo 30 g.

3. FÓRMULA

Cada 100 g contém:

Albendazol 8,0 g;

Triclorfon 58 g;

Excipiente q.s.p 100 g.

4. PROPRIEDADES

HIPOTAC é uma associação de dois anti-helmínticos de amplo espectro, albendazol e triclorfon. O albendazol é um composto benzimidazólico. Ativos desta classe atuam sobre os parasitos por ligação a tubulina, a subunidade estrutural proteica dos microtúbulos, estruturas que compõe o citoesqueleto da célula, interrompendo processos vitais para função celular, como a divisão mitótica, o transporte de nutrientes e a alteração na forma da célula. Triclorfon, um organofosforado cujo mecanismo de ação ocorre através da inibição irreversível da molécula de acetilcolinesterase, o que conduz ao bloqueio da hidrólise da acetilcolina. Desta maneira a acetilcolina não degradada provoca a excitação nas sinapses dependentes de estimulação colinérgica, onde o neurotransmissor acumulado provoca hiperexcitabilidade, seguida de incoordenação e morte do parasita.

5. INDICAÇÕES

O produto Hipotac é um vermicida de amplo espectro para equinos com atividade contra as formas adultas de *Trichostrongylus axei*, *Habronema muscae*, *Gasterophylus nasalis* e *Oxyuris equi*.

Grandes estrôngilos: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*.

Pequenos estrôngilos: *Cylicostephanus latinatum*, *Cyathostomum labiatum*, *Cyathostomum coronatum*, *Cyathostomum parteratum*, *Cyathostomum*

tetracantum, Cyathostomum labratum, Cylicocyclus insigne, Cylicocyclus radiatus, Cylicocyclus elongatus, Cylicodontophorus bicoronatus, Posteriostrongylus ratzii, Gyalocephalus capitatus.

6. POSOLOGIA

Hipotac é um produto de dose única, pronto para uso, administrado por via oral, de acordo com o peso do animal. A dose de 6,0 g de Hipotac trata 100 kg de peso (35 mg de triclorfon/kg e 5 mg de albendazol/kg de peso).

O conteúdo total de cada injetor é suficiente para tratar 500 kg de peso.

7. ADVERTÊNCIAS

Em caso eventual de acidentes com pessoas, procurar imediatamente o médico.

Lavar bem as mãos, sempre que houver contato com o produto;

Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos;

Não reutilizar as embalagens;

Os recipientes do produto e qualquer outro conteúdo residual devem ser descartados de forma segura evitando a contaminação do meio ambiente.

8. EFEITOS ADVERSOS

Hipotac quando testado na dose indicada para equinos não causou efeitos adversos sistêmicos ou locais, se mostrando seguro para as espécies-alvo.

9. ANTÍDOTO

Em casos de intoxicação administrar sulfato de atropina na dose de 0,2 a 0,5 mg/kg, sendo que um quarto da dose deve ser administrada via intravenosa e o restante, intramuscular ou subcutâneo.

10. CONTRAINDICAÇÃO

A segurança do produto não foi avaliada em potros menores de 12 meses, fêmeas em lactação ou animais em estágios reprodutivos;

Não tratar animais exaustos, após exercícios físicos intensos;

Evitar o uso em animais caquéticos, animais com diarreias e com infecções que alterem seu estado geral.

11. PRECAUÇÃO

15 a 20 minutos depois do tratamento os animais não deverão ter acesso a água e comida;

Observar um intervalo mínimo de 3 semanas entre os tratamentos;

12. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

Não fazer tratamentos simultâneos com outros fosforados.

13. PERÍODO DE CARÊNCIAS

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

EQUINOS

ABATE: PRODUTO NÃO INDICADO PARA EQUINOS DESTINADOS AO ABATE;

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 000009-4.000012 em 29/04/1991.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico-veterinário.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Roberta Costa e Sousa Rezende

CRF-SP 88.540

PROPRIETÁRIO

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A

Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;

Itapevi – SP;

CEP: 06696-000;

CNPJ: 61.190.096/0008-69.

FABRICANTE

IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA;

Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Bairro Barreiro /Araçoiaba da Serra - SP,

CEP: 18190- 000;

CNPJ: 64.867.015/0001-52

DISTRIBUÍDO POR

PEARSON SAÚDE ANIMAL;

Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;

Itapevi – SP;

CEP: 06696-000;

CNPJ: 07.746.586/0002-68.

® Marca registrada — Indústria brasileira

Contém: 1 injetor de 30 g