

1. Nome do produto Tacplus Banheiro**1.1 Molécula** Amitraz**1.2 Classe terapêutica** Carrapaticida**USO VETERINÁRIO****2. APRESENTAÇÕES**

Caixa contendo 2 latas com 800 mL de solução A, caixa contendo 1 saco com 6 kg de solução B.

3. FÓRMULA

Cada 100 mL contém:

Amitraz 12,5 g;

Excipiente q.s.p 100 mL.

4. PROPRIEDADES

O amitraz é uma formamidina que age nos receptores octopaminérgicos dos artrópodes, principalmente dos ácaros como o carrapato. A octopamina é um neurotransmissor dos artrópodes que atua no sistema nervoso central e periférico, modulando a excitabilidade muscular. A ação agonista do amitraz leva a uma marcada hiperexcitabilidade, com consequente alteração da motilidade do parasita. Sua ação é letal pela fixação mais persistente do amitraz aos receptores do que o próprio neurotransmissor.

5. INDICAÇÕES

O Tacplus Banheiro atua nas infestações dos bovinos pelo carrapato *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, eliminando os carrapatos adultos. Interfere na oviposição impedindo a postura de ovos férteis.

6. POSOLOGIA

Produto de uso externo em banheiros de imersão para bovinos.

- Doses: Carga: 2 latas de 800 mL + 6 kg de pó alcalinizante para 1000 litros de água. A concentração calda com esta diluição corresponde à 200 ppm.
- Recarga: 2 latas de 800 mL + 6 kg de pó alcalinizante para 500 litros de água.
- O pó alcalinizante deve ser despejado diretamente no banheiro.
- Misturar o conteúdo das latas em um balde com igual quantidade de água, mexer bem e despejar no banheiro.
- Nunca despeje o líquido sem antes despejar o pó alcalinizante.

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES:

Antes de iniciar o banho, agite bem a água do banheiro no sentido de se obter uma distribuição uniforme.

MANEJO DO BANHEIRO:

O término de cada banho, marcar o nível de líquido deixado no banheiro em uma régua. Se ao iniciar o banho seguinte, este nível tiver subido devido a entrada de água de chuva, adicionar o produto líquido + pó, como no caso de recarga, de acordo com a quantidade de água que entrou no banheiro.

DURAÇÃO DE USO APÓS PREPARAÇÃO:

TACPLUS BANHEIRO é estável por 12 meses, considerando-se a passagem de 2.500 animais e realização de 3 recargas no período, sempre que há queda superior a 10% no volume.

INTERVALOS ENTRE DOSAGENS:

Produto dose única.

CUIDADOS GERAIS:

O produto não deverá ser administrado em períodos com previsões de chuvas. Chuvas torrenciais podem remover o produto da superfície do corpo dos animais tratados, diminuindo o período de proteção proporcionado pelo produto no controle das endectoparasitoses.

7. ANTÍDOTO

Não há antídoto específico. Tratamento sintomático.

INTOXICAÇÃO E SUPERDOSAGEM:

Os sinais clínicos são agudos e caracterizam-se, principalmente, por ataxia, depressão, mas essa fase pode ser precedida por estimulação e agressividade transitórias. O tratamento é sintomático e de detoxificação. Após exposição tópica, os animais devem ser lavados com bastante água morna e sabão, atenção deve ser dada a queda de temperatura. Em casos de bradicardia e depressão

acentuada, o uso de antagonista alfa-2 adrenérgicos, como ioimbina e atipamazole, com repetições a cada 4 ou 8 horas, se necessário. **O uso de atropina deve ser evitado.** Uma vez que é hiperglicemiante, soluções glicosadas são contraindicadas.

8. CONTRAINDICAÇÃO

Em equinos pode levar ao aparecimento de cólica.

Não tratar animais doentes, especialmente animais jovens.

A segurança do produto não foi avaliada em animais com idade inferior a 12 meses, fêmeas gestantes e em lactação ou machos em atividade reprodutiva.

9. PRECAUÇÃO

Utilizar luvas para o manuseio do produto;

Lavar bem as mãos, sempre que houver contato com o produto;

Em caso eventual de acidentes com pessoas, procurar imediatamente o médico.

Cuidado veneno!

Produto tóxico para organismos aquáticos.

Descartar a calda de banho dos animais de forma segura para o meio ambiente, preferencialmente através de empresa especializada em coleta e descarte de resíduos líquidos, de acordo com a legislação ambiental local.

10. PERÍODO DE CARÊNCIAS

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 02 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 12 HORAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO;

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não usar a embalagem vazia. Não guardar ou

aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 000009-4.000008 em 04/09/2006.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico-veterinário.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Roberta Costa e Sousa Rezende

CRF-SP 88.540

PROPRIETÁRIO

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A

Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;

Itapevi – SP;

CEP: 06696-000;

CNPJ: 61.190.096/0008-69.

FABRICANTE

IPANEMA INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA;

Rodovia Raposo Tavares, km 113 - Bairro Barreiro /Araçoiaba da Serra - SP,

CEP: 18190- 000;

CNPJ: 64.867.015/0001-52

DISTRIBUÍDO POR

PEARSON SAÚDE ANIMAL;

Rodovia Presidente Castello Branco, km 35,6, Itaqui;

Itapevi – SP;

CEP: 06696-000;

CNPJ: 07.746.586/0002-68.

® Marca registrada — Indústria brasileira