

## **1. Unguento Plus Aerossol**

### **1.1 Óxido de zinco**

**Permetrina**

### **1.2 Cicatrizante**

**Larvicida**

**Repelente**

## **USO VETERINÁRIO**

## **2. APRESENTAÇÕES**

Lata de 400 mL contendo 250 g de produto.

## **3. FÓRMULA**

Cada 100 g contém:

Óxido de zinco ..... 25,0 g;

Permetrina ..... 0,5 g;

Excipiente ..... q.s.p 100 g.

## **4. INDICAÇÕES**

O produto Unguento Plus Aerossol é indicado como cicatrizante, larvicida e repelente, em bovinos.

O produto Unguento Plus Aerossol é indicado como cicatrizante, larvicida e repelente, em equinos.

## **5. POSOLOGIA**

Administrar de modo a cobrir toda a área a ser tratada, para equinos e bovinos, direcionando o jato a uma distância aproximada de 10cm da ferida por 5 segundos, durante uma vez ao dia durante cinco dias consecutivos para a ação cicatrizante. A aplicação para ação repelente e larvicida é única.

## **6. ADVERTÊNCIAS**

Atender o período de carências informado na rotulagem;

Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos;

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir, consulte um médico levando a embalagem ou rótulo do produto;

Não ingerir: não desentupa a válvula com a boca;

Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

Ler a bula atentamente antes de administrar o produto;

Não aplicar próximo a chamas: produto inflamável, não jogar a embalagem vazia no incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas; Usar equipamentos de proteção adequados, tais como, luvas, óculos de proteção, avental etc.: use protetor ocular, use máscaras cobrindo o nariz e a boca e use luvas de borracha; Usar luvas para sua aplicação: use luvas de borracha.

## 7. EFEITOS ADVERSOS

Nas doses indicadas não houve efeitos colaterais, conforme os estudos de segurança realizados com UNGUENTO PLUS AEROSOL.

## 8. PRECAUÇÕES

Utilizar o produto em até 06 meses.

## 9. ANTÍDOTO

**Grupo químico:** piretróides.

**Antídoto:** não há antídoto específico. Tratamento sintomático.

### **Primeiros socorros:**

**Inalação:** remova a vítima para local arejado;

**Contato com a pele:** remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 15 minutos;

**Contato com os olhos:** lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos mantendo as pálpebras abertas;

**Ingestão:** lave a boca da vítima com água em abundância. Não induza o vômito. Procure assistência médica levando a embalagem do produto.

### **Tratamento médico de emergência:**

Mantenha a vítima em repouso e aquecida. O tratamento sintomático deve compreender sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

## 10. CONTRAINDICAÇÃO

A segurança do produto não foi avaliada em bezerros menores de 10 meses e potros menores de 12 meses, fêmeas em lactação ou animais em estágios reprodutivos.

## 11. PERÍODO DE CARÊNCIAS

“ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DE SER REALIZADO 4 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O LEITE DE ANIMAIS TRATADOS.

EQUINOS

ABATE: PRODUTO NÃO INDICADO PARA EQUINOS DESTINADOS AO ABATE;

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO”.

**Conservar o produto em sua embalagem original fechada, em local seco e fresco, entre 15 °C e 30 °C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.**

**Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n.º SP 000009-4.000019 em 17/10/1991.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Dra. Roberta Costa e Sousa Rezende;  
Farmacêutica - CRF-SP 88.540.

**PROPRIETÁRIO**

Eurofarma Laboratórios S.A;  
Rodovia Presidente Castello Branco, Km 35,6 - Itaqui / Itapevi - SP - CEP: 06696-000;  
CNPJ: 61.190.096/0008-69.

**FABRICANTE**

Ipanema Indústria de Produtos Veterinários LTDA;  
Rodovia Raposo Tavares, s/n, Caixa 6211 - km 113 - Bairro Barreiro, Araçoiaba da Serra - SP, CEP: 18190-000;  
CNPJ: 64.687.015/0001-52.

**® Marca registrada — Indústria brasileira**

<b>Partida (PART.)</b>	[Pode ser carimbo]
<b>Fabricação (FABR.)</b>	
<b>Vencimento (VENC.)</b>	

Peso líquido: 250 g;  
Conteúdo: 400 mL.